Evaluación final

Organización Mundial de la Salud

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas?

- [ ] Los episodios de alteraciones del estado del ánimo son entidades diagnosticables de manera independiente, pero también pueden ser parte de un Trastorno Depresivo o Bipolar.
- [ ] Los episodios de alteraciones del estado del ánimo NO son entidades diagnósticas independientes, sino componentes de los trastornos depresivos o bipolares.
- [ ] En la CIE-11, los diagnósticos de trastornos del estado del ánimo se establecen con base en cuatro tipos de episodios de alteraciones del estado del ánimo y en su patrón de presentación en el transcurso del tiempo.
- [ ] En la CIE-11, los trastornos del estado del ánimo se diagnostican específicamente con base en los síntomas depresivos, maniacos y/o hipomaniacos actuales.

Evaluación final

Organización Mundial de la Salud

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas?

- [ ] Los episodios de alteraciones del estado del ánimo son entidades diagnosticables de manera independiente, pero también pueden ser parte de un Trastorno Depresivo o Bipolar.
- [x] Los episodios de alteraciones del estado del ánimo NO son entidades diagnósticas independientes, sino componentes de los trastornos depresivos o bipolares.
- [x] En la CIE-11, los diagnósticos de trastornos del estado del ánimo se establecen con base en cuatro tipos de episodios de alteraciones del estado del ánimo y en su patrón de presentación en el transcurso del tiempo.
- [ ] En la CIE-11, los trastornos del estado del ánimo se diagnostican específicamente con base en los síntomas depresivos, maniacos y/o hipomaniacos actuales.

Evaluación final

Organización Mundial de la Salud



En la CIE-11, la presencia de estado de ánimo depresivo no es más un requisito absoluto para un Episodio depresivo. El componente afectivo de un Episodio depresivo se puede manifestar también con una marcada pérdida de interés o placer en las actividades, especialmente en aquellas que normalmente se disfrutaban.

- Verdadero
- Falso

Evaluación final

Organización Mundial de la Salud



En la CIE-11, la presencia de estado de ánimo depresivo no es más un requisito absoluto para un Episodio depresivo. El componente afectivo de un Episodio depresivo se puede manifestar también con una marcada pérdida de interés o placer en las actividades, especialmente en aquellas que normalmente se disfrutaban.

- (●) Verdadero
- ( ) Falso

Evaluación final

Organización Mundial de la Salud



La CIE-11 reconocer que un episodio depresivo puede estar presente durante un periodo de duelo. Sin embargo, el diagnóstico de un episodio depresivo NO debe considerarse si el/la paciente experimenta síntomas de duelo regulares y no ha tenido una historia de Trastorno Depresivo o Bipolar.

- Verdadero
- Falso

Evaluación final

Organización Mundial de la Salud



La CIE-11 reconocer que un episodio depresivo puede estar presente durante un periodo de duelo. Sin embargo, el diagnóstico de un episodio depresivo NO debe considerarse si el/la paciente experimenta síntomas de duelo regulares y no ha tenido una historia de Trastorno Depresivo o Bipolar.

- [x] Verdadero
- [ ] Falso

Evaluación final

Organización Mundial de la Salud

Usted se encuentra evaluando a una mujer de 35 años de edad con una historia de dos episodios depresivos, pero sin antecedentes de episodios maniacos, hipomaniacos o mixtos. Ella ha respondido a tratamiento y actualmente no cumple los requerimientos de un Episodio depresivo, pero continua mostrando algunos síntomas depresivos. ¿Cuál es el mejor diagnóstico para esta persona según la CIE-11?

- Trastorno depresivo recurrente, episodio actual leve.
- Trastorno depresivo recurrente, episodio actual moderado, sin síntomas psicóticos
- Trastorno depresivo recurrente, actualmente en remisión parcial
- Trastorno depresivo recurrente, actualmente en remisión completa
- Ningún diagnóstico

Evaluación final

Organización Mundial de la Salud

Usted se encuentra evaluando a una mujer de 35 años de edad con una historia de dos episodios depresivos, pero sin antecedentes de episodios maniacos, hipomaniacos o mixtos. Ella ha respondido a tratamiento y actualmente no cumple los requerimientos de un Episodio depresivo, pero continua mostrando algunos síntomas depresivos. ¿Cuál es el mejor diagnóstico para esta persona según la CIE-11?

- ○ Trastorno depresivo recurrente, episodio actual leve.
- ○ Trastorno depresivo recurrente, episodio actual moderado, sin síntomas psicóticos
- ● Trastorno depresivo recurrente, actualmente en remisión parcial
- ○ Trastorno depresivo recurrente, actualmente en remisión completa
- ○ Ningún diagnóstico

Evaluación final

Organización Mundial de la Salud



La presencia de síntomas psicótico no necesariamente implica que el Episodio depresivo es grave.

- Verdadero
- Falso

Evaluación final

Organización Mundial de la Salud



La presencia de síntomas psicótico no necesariamente implica que el Episodio depresivo es grave.

- (●) Verdadero
- ( ) Falso

Evaluación final

Organización Mundial de la Salud



El diagnóstico de Trastorno depresivo no puede establecerse simultáneamente con un Trastorno de Ansiedad Generalizada ni con un Trastorno de Pánico.

- Verdadero
- Falso

Evaluación final

Organización Mundial de la Salud



El diagnóstico de Trastorno depresivo no puede establecerse simultáneamente con un Trastorno de Ansiedad Generalizada ni con un Trastorno de Pánico.

- ○ Verdadero
- ◉ Falso

Evaluación final

Organización Mundial de la Salud



En la CIE-11, el diagnóstico de un Trastorno distímico puede asignarse aun cuando haya habido un periodo de solo dos semanas **durante los primeros dos años del trastorno** en el que el número y duración de los síntomas fueron suficientes para cubrir los requisitos diagnósticos para un Episodio depresivo.

Verdadero

Falso

Evaluación final

Organización Mundial de la Salud



En la CIE-11, el diagnóstico de un Trastorno distímico puede asignarse aun cuando haya habido un periodo de solo dos semanas **durante los primeros dos años del trastorno** en el que el número y duración de los síntomas fueron suficientes para cubrir los requisitos diagnósticos para un Episodio depresivo.

- ○ Verdadero
- ■ Falso

Evaluación final

Organización Mundial de la Salud

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta según las guías CIE-11 para el Trastorno Bipolar Tipo I?

El trastorno bipolar tipo I se diagnostica con base en una historia de al menos un episodio maniaco y al menos un episodio depresivo.

El trastorno bipolar tipo I se diagnostica con base en la historia de la menos un episodio mixto y al menos un episodio depresivo.

El trastorno bipolar tipo I se diagnostica con base en la presencia de un episodio maniaco o depresivo y la historia de al menos un episodio mixto.

El trastorno bipolar tipo I se diagnostica con base en la presencia de un episodio maniaco o mixto, pero generalmente consiste en episodios tanto maniacos como mixtos y episodios depresivos a lo largo del tiempo.

Evaluación final

Organización Mundial de la Salud

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta según las guías CIE-11 para el Trastorno Bipolar Tipo I?

- El trastorno bipolar tipo I se diagnostica con base en una historia de al menos un episodio maniaco y al menos un episodio depresivo.
- El trastorno bipolar tipo I se diagnostica con base en la historia de la menos un episodio mixto y al menos un episodio depresivo.
- El trastorno bipolar tipo I se diagnostica con base en la presencia de un episodio maniaco o depresivo y la historia de al menos un episodio mixto.
- El trastorno bipolar tipo I se diagnostica con base en la presencia de un episodio maniaco o mixto, pero generalmente consiste en episodios tanto maniacos como mixtos y episodios depresivos a lo largo del tiempo.

Evaluación final

Organización Mundial de la Salud

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta según las guías CIE-11 para el Trastorno Bipolar Tipo II?

El diagnóstico de un Trastorno bipolar tipo II requiere de una historia de al menos un episodio hipomaniaco.

El diagnóstico de un Trastorno bipolar tipo II de diagnostica con base en un episodio maniaco o depresivo y antecedente de al menos un episodio mixto.

El diagnóstico de un Trastorno bipolar tipo II implica antecedente de al menos un episodio depresivo y al menos un episodio hipomaniaco, maniaco o mixto.

El diagnóstico de un Trastorno bipolar tipo II implica antecedente de al menos un episodio depresivo y al menos un episodio hipomaniaco, así como de la ausencia de episodios maniacos o mixtos.

Evaluación final

Organización Mundial de la Salud

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta según las guías CIE-11 para el Trastorno Bipolar Tipo II?

- El diagnóstico de un Trastorno bipolar tipo II requiere de una historia de al menos un episodio hipomaniaco.
- El diagnóstico de un Trastorno bipolar tipo II de diagnostica con base en un episodio maniaco o depresivo y antecedente de al menos un episodio mixto.
- El diagnóstico de un Trastorno bipolar tipo II implica antecedente de al menos un episodio depresivo y al menos un episodio hipomaniaco, maniaco o mixto.
- El diagnóstico de un Trastorno bipolar tipo II implica antecedente de al menos un episodio depresivo y al menos un episodio hipomaniaco, así como de la ausencia de episodios maniacos o mixtos.

Evaluación final

Organización Mundial de la Salud



Para diagnosticar un trastorno ciclotímico, la persona debe haber experimentado síntomas hipomaniacos y depresivos durante un periodo de al menos dos años.

Verdadero

Falso

Evaluación final

Organización Mundial de la Salud



Para diagnosticar un trastorno ciclotímico, la persona debe haber experimentado síntomas hipomaniacos y depresivos durante un periodo de al menos dos años.

- (●) Verdadero
- ( ) Falso