

Unidad 5

Evaluación final

Seleccione la respuesta más apropiada para las diez preguntas. Al finalizar haga clic en Enviar.

Usted deberá calificar adecuadamente al menos un 80% para obtener su Certificado de finalización.

Haga clic en siguiente para comenzar.



Evaluación final



En la CIE-11, el grupo de trastornos de ansiedad y relacionados con el miedo incluye a la mayoría de los trastornos en los que la ansiedad es el síntoma prominente, pero no todos, pues otros trastornos como el trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno por estrés posttraumático se encuentran en otros grupos separados para trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados, y trastornos específicamente relacionados con el estrés.

- Verdadero
- Falso

Evaluación final



En la CIE-11, el grupo de trastornos de ansiedad y relacionados con el miedo incluye a la mayoría de los trastornos en los que la ansiedad es el síntoma prominente, pero no todos, pues otros trastornos como el trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno por estrés posttraumático se encuentran en otros grupos separados para trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados, y trastornos específicamente relacionados con el estrés.

- Verdadero
- Falso

Evaluación final



La presencia de ataques de pánico siempre justifica el diagnóstico de trastorno de pánico.

- Verdadero
- Falso

Evaluación final



La presencia de ataques de pánico siempre justifica el diagnóstico de trastorno de pánico.

- Verdadero
- Falso

Evaluación final



Dependiendo de la presentación clínica, todos los siguientes pueden ser diagnosticados en la CIE-11, EXCEPTO:

- Agorafobia con ataques de pánico
- Agorafobia
- Trastorno de pánico con ataques de pánico
- Trastorno de pánico y Trastorno de ansiedad generalizada

Evaluación final



Dependiendo de la presentación clínica, todos los siguientes pueden ser diagnosticados en la CIE-11, EXCEPTO:

- Agorafobia con ataques de pánico
- Agorafobia
- Trastorno de pánico con ataques de pánico
- Trastorno de pánico y Trastorno de ansiedad generalizada

Evaluación final



La siguiente es una característica central que puede utilizarse para diferenciar entre los trastornos de ansiedad y relacionados con el miedo:

- Diferentes síntomas físicos de ansiedad específicos para cada trastorno
- Diferentes conductas específicas para cada trastorno
- Diferente foco de aprensión específico para cada trastorno
- Intensidad del miedo o ansiedad reportada por el/la paciente

Evaluación final



La siguiente es una característica central que puede utilizarse para diferenciar entre los trastornos de ansiedad y relacionados con el miedo:

- Diferentes síntomas físicos de ansiedad específicos para cada trastorno
- Diferentes conductas específicas para cada trastorno
- Diferente foco de aprensión específico para cada trastorno
- Intensidad del miedo o ansiedad reportada por el/la paciente

Evaluación final



Solo ante las siguientes condiciones se puede diagnosticar de manera concurrente al trastorno de ansiedad generalizada (TAG) y a un trastorno depresivo:

- Los síntomas depresivos preceden a la presencia de síntomas de TAG.
- Los síntomas de TAG preceden a la presencia de síntomas depresivos.
- Existe evidencia de que los síntomas de TAG han ocurrido de manera concurrente con síntomas depresivos.
- El TAG nunca debe diagnosticarse junto con un Trastorno Depresivo.

Evaluación final



Solo ante las siguientes condiciones se puede diagnosticar de manera concurrente al trastorno de ansiedad generalizada (TAG) y a un trastorno depresivo:

- Los síntomas depresivos preceden a la presencia de síntomas de TAG.
- Los síntomas de TAG preceden a la presencia de síntomas depresivos.
- Existe evidencia de que los síntomas de TAG han ocurrido de manera concurrente con síntomas depresivos.
- El TAG nunca debe diagnosticarse junto con un Trastorno Depresivo.

Evaluación final



John informa sentirse nervioso la mayor parte del día durante el año pasado acompañado de sentimientos de pavor. Cuando se le pregunta si está pensando en algo en particular cuando está ansioso, responde negativamente. John también informa que con frecuencia experimenta dolor de cuello y hombros, episodios de diarrea y dificultad para dormir que acompañan a su ansiedad. Según la información limitada proporcionada ¿cuál sería el mejor diagnóstico de acuerdo con la CIE-11?:

- Trastorno de ansiedad generalizada
- Trastorno de pánico
- Trastorno de ansiedad social
- Fobia específica

Evaluación final



John informa sentirse nervioso la mayor parte del día durante el año pasado acompañado de sentimientos de pavor. Cuando se le pregunta si está pensando en algo en particular cuando está ansioso, responde negativamente. John también informa que con frecuencia experimenta dolor de cuello y hombros, episodios de diarrea y dificultad para dormir que acompañan a su ansiedad. Según la información limitada proporcionada ¿cuál sería el mejor diagnóstico de acuerdo con la CIE-11?:

- Trastorno de ansiedad generalizada
- Trastorno de pánico
- Trastorno de ansiedad social
- Fobia específica

Evaluación final



Un adulto que presenta un miedo excesivo de separación de su hijo que está asociado con malestar emocional y disfunción se diagnostica mejor en la CIE-11 con:

- Trastorno por ansiedad de separación
- Trastorno de ansiedad social
- Agorafobia
- Trastorno de pánico

Evaluación final



Un adulto que presenta un miedo excesivo de separación de su hijo que está asociado con malestar emocional y disfunción se diagnostica mejor en la CIE-11 con:

- Trastorno por ansiedad de separación
- Trastorno de ansiedad social
- Agorafobia
- Trastorno de pánico

Evaluación final



Una persona que informa sentirse muy ansiosa cuando se encuentra en un centro comercial o en la oficina de correos podría sufrir de:

- Trastorno de ansiedad generalizada
- Agorafobia
- Fobia específica
- Trastorno por ansiedad de separación

Evaluación final



Una persona que informa sentirse muy ansiosa cuando se encuentra en un centro comercial o en la oficina de correos podría sufrir de:

- Trastorno de ansiedad generalizada
- Agorafobia
- Fobia específica
- Trastorno por ansiedad de separación

¡Felicidades!

100%

